

# 卡介苗

## 肺癆病（結核病）

肺癆病（結核病）是一種透過空氣所傳播的傳染病。癆菌通常被吸入肺部後，會形成肺癆（肺結核）。在肺部的癆菌亦可經由血液循環至身體其它部位，例如骨骼、肝臟、腦部、腎臟等，引起結核病。由於香港人煙稠密，肺癆病仍然是一個重要的傳染病。

## 卡介苗（BCG）

### 甲、 為什麼需要接種？

卡介苗（BCG）雖然不能百份百預防癆菌感染，但它能夠有效地預防肺癆病引起的嚴重併發症。卡介苗已包括在香港兒童免疫接種計劃內。

### 乙、 接種的時間

新生嬰兒於出生後應盡快接種卡介苗。十五歲以下的居港兒童如從未接種卡介苗，亦可以直接接種。

### 丙、 不宜接種的人士

1. 在過去四星期內曾接種活菌疫苗 (live vaccine) [四星期過後便可接受卡介苗]
2. 接受抑制免疫系統的治療(例如：放射治療、抗癌藥物治療或類固醇)
3. 患先天或後天免疫能力缺乏症(例如：愛滋病患者)
4. 患有癌病(例如：白血病、淋巴癌)
5. 患有嚴重的皮膚病
6. 母親在懷孕期間曾接受生物製劑治療(先向專科醫生查詢，是否有需要延遲接受疫苗注射)

### 丁、 接種的副作用

- 有些人在接種卡介苗二至四星期內，在接種的部位會出現小紅丘疹或潰瘍，但幾星期後會逐漸退卻及痊癒，留下極輕微的疤痕或甚至不留疤痕。間中有些兒童會因淋巴腺脹大以致腋窩下腫起。其他不良反應，則極為罕見。
- 如有灌膿或小潰瘍情況出現，亦是正常現象，家長不用擔心。嬰兒可照常淋浴，只要保持接種的部位清潔乾爽，需要時用凍開水清潔，並以紗布吸乾水分。
- 切勿在接種的部位塗搽任何藥物、藥水或藥膏。無須貼上膠布或包紮，並避免緊身衣物。
- 大部分接種卡介苗後的局部反應會自然消退，故家長無須過分擔心。

如有任何疑問，請向衛生署轄下各母嬰健康院查詢。