


# 低度鱗狀上皮內病變 LSIL

子宮頸細胞檢驗若顯示有低度鱗狀上皮內病變，即表示細胞有輕度變壞現象。由子宮頸細胞嚴重變壞至惡化成為癌症，一般需時五至十年；故此短期內對生命構成危險的機會甚微，請不用過分擔心。而其中亦有部分婦女的細胞會回復正常。



細胞檢驗並不能完全反映子宮頸組織變壞之程度，根據過往的醫學報告顯示，每一千名初步檢驗出子宮頸細胞有輕度變壞的婦女中，約有一百五十名婦女的子宮頸細胞有嚴重變壞。為作出更準確的診斷，婦女需要接受進一步的「陰道鏡」檢查，以便抽取子宮頸組織作詳細化驗。

## 陰道鏡檢查

### 什麼是陰道鏡檢查？

子宮頸及陰道鏡檢查是利用放大鏡進行陰道及子宮頸檢查。檢查程序在一般診療室進行，毋須麻醉，需時約十分鐘。

### 施行步驟

醫生會放入陰道窺器，在陰道和子宮頸塗上特別藥液，然後透過放大鏡找出細胞變異的地方。若發現變異的組織，醫生會用儀器抽取小片組織送往化驗。