

非活性脊髓灰質炎（小兒麻痺）疫苗

脊髓灰質炎（小兒麻痺）

脊髓灰質炎病毒經食道侵入人體，隨血液循環進入中樞神經系統。症狀包括發熱、全身不適，數天後全身疼痛、肌肉痙攣、四肢震顫、肌肉麻痺，甚至呼吸困難，嚴重的可以致命。

非活性脊髓灰質炎疫苗（IPV）

甲. 需要接受疫苗的人士

脊髓灰質炎疫苗能夠有效地預防小兒麻痺。在香港，一般兒童應接受非活性脊髓灰質炎疫苗（Inactivated Poliovirus Vaccine / IPV）。

乙. 接受疫苗的時間

為達到全面及持久的免疫效果，小童需要在出生後一年內接受兩劑非活性脊髓灰質炎疫苗（由兩個月大開始，每劑相隔兩個月），並在一歲半時接受一劑加強劑。另外兩劑加強劑應在小一及小六時接種。非活性脊髓灰質炎疫苗可與其他疫苗一起接種。

丙. 不宜接受疫苗的人士

1. 接受非活性脊髓灰質炎疫苗後曾有嚴重的過敏反應
2. 對鏈霉素（streptomycin）、新霉素（neomycin）或多粘菌素 B（polymyxin B）曾有嚴重的過敏反應

丁. 接受疫苗後的風險

- 如同所有藥物，非活性脊髓灰質炎疫苗可能會引起一些不良反應。
- 大多數接受非活性脊髓灰質炎疫苗注射的人，都不會有嚴重反應。間中針口有輕微疼痛，一兩天後會自然消退。

如有任何疑問，請到衛生署轄下各母嬰健康院查詢。