

滅活小兒麻痺疫苗

脊髓灰質炎（小兒麻痺）

脊髓灰質炎病毒經食道侵入人體，隨血液循環進入中樞神經系統。症狀包括發燒、全身不適，數天後全身疼痛、肌肉痙攣、四肢震顫、肌肉麻痺，甚至呼吸困難，嚴重的可以致命。

滅活小兒麻痺疫苗（IPV）

甲、 為什麼需要接種？

小兒麻痺疫苗能夠有效地預防小兒麻痺。在香港，兒童應接受滅活小兒麻痺疫苗（Inactivated Poliovirus Vaccine / IPV）。

乙、 接種的時間

- 為達到全面及持久的免疫效果，小童需要在出生後一年內接受三劑滅活小兒麻痺疫苗（在二、四及六個月大），並在一歲半時接受一劑加強劑。另外兩劑加強劑應在小一及小六時接種。未曾依建議時段完成接種的兒童，應接種足夠的滅活小兒麻痺疫苗劑數以完成免疫系列。
- 滅活小兒麻痺疫苗可與其他疫苗一起接種。

丙、 不宜接種的人士

- 接受滅活小兒麻痺疫苗後曾有嚴重的過敏反應
- 對某些抗生素或防腐劑曾有嚴重的過敏反應

丁、 接種的副作用

大多數接受滅活小兒麻痺疫苗注射的人，不會有嚴重反應。間中針口有輕微疼痛，一兩天後會自然消退。

如有任何疑問，請向衛生署轄下各母嬰健康院查詢。