

陰道鏡檢查診斷：子宮頸中度／嚴重的細胞病變 (HSIL)

陰道鏡檢查已診斷子宮頸細胞有中度／嚴重的細胞病變，這表示什麼？

[備註: HSIL 前稱為 *Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) II / III*]

- 當婦女透過陰道鏡檢查或活組織檢驗而被診斷有子宮頸鱗狀上皮內病變(Squamous Intra-epithelial Lesion，簡稱 SIL)，表示子宮頸上皮組織出現不正常或病變的細胞。
- 如你的檢驗報告顯示子宮頸組織有中度至嚴重(HSIL)的細胞病變，而你已經獲得適當的專科治療，現階段，你需要進行較頻密的子宮頸檢驗以作監察。

你應何時接受檢驗？

根據香港婦產科學院於 2024 年訂定有關子宮頸癌預防及篩查的指引，你會被安排在接受治療後六個月接受子宮頸人類乳頭瘤病毒(HPV)檢驗，然後在往後兩年，每年接受一次子宮頸 HPV 檢驗。若所有結果正常，你須接着在往後 25 年，每三年接受一次子宮頸檢驗，然後回復例行子宮頸普查直至 65 歲(以日期較後者為準)。

若子宮頸檢驗報告顯示不正當，檢驗計劃可能會根據你的檢驗結果而作出調較。

如有任何疑問，歡迎向醫護人員查詢。

